

吸入器の使い方

■ 1回分ずつアンプルに入っている薬

- ① インタール (抗アレルギー剤)
- ② パルミコート (ステロイド)
- ③ メプチンユニット (気管支拡張剤)
- ④
- ⑤
- アンプルをパキッと折って、液をマウスピースに入れて下さい。

1日	回	1回に1アンプル(ml)
<input type="checkbox"/> 朝	<input type="checkbox"/> 昼(学校から帰ってきた時)	<input type="checkbox"/> 寝る前	
<input type="checkbox"/> 必要時			
(時間以上あけて、	回/日まで)	

■ こどもクリニックで調剤した吸入薬

吸入液を希釈して安全に吸入できるように調剤したものです。冷蔵庫で保管してください。

- ⑥ ベネトリン/生理食塩水 (10倍希釈液)
- ⑦ ベネトリン/生理食塩水+デカドロン (ステロイド)
- ⑧
- ⑨
- スポイド付きの水薬瓶に入っています。
- 1回量をスプーンで測って下さい。

1日	回	1回に	ml
<input type="checkbox"/> 朝	<input type="checkbox"/> 昼(学校から帰ってきた時)	<input type="checkbox"/> 寝る前	
<input type="checkbox"/> 必要時			
(時間以上あけて、	回/日まで)	

- 薬を混ぜて吸入するとき
()と()と一緒に混ぜてマウスピースに入れてください。

- 吸入は5分間してください。

■ 追加で吸入するとき ()を	時間以上あけて、
	回/日まで

吸入器のお手入れ



- 吸入器は電動ポンプの本体と、ポンプから空気をおくるチューブと、薬を入れて噴霧するマウスピースの部分で出来ています。

- 吸入が終わったらマウスピースの部分を分解して水洗いしましょう。

- パッキングのゴムや吸入器の真ん中の小さな部品をなくさないように気をつけましょう。

- ミルトン (哺乳瓶などの消毒薬) があれば使っても結構です。

- 唾液などで汚れがひどいときには、食器洗い用の洗剤で洗って下さい。洗剤を使ったときには水でよくすすいで下さい。

- 沸騰したお湯は決して使わないで下さい。プラスチックが変形してしまいます。食器乾燥機も使わないでください。

- 器具の使い方がわからないときや、部品を紛失したときや、壊れたときには看護婦さんに相談して下さい。

- 泣いていても、吸入は効果があります。お父さんにしっかり抱っこしてもらって、マウスピースを口から2~3cmくらい離して吸入して下さい。