



ワクチン	種類	乳児期								幼児期					学童期／思春期									
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌 b 型 (ヒブ)	不活化			①	②	③					④ (注 1)													
肺炎球菌 (PCV13) (注 2)	不活化			①	②	③					④		(注 2)											
B 型肝炎 (HBV)	ユニバーサル (注 3)			①	②				③														(注 4)	
	母子感染予防	①	②						③															
ロタウイルス	1 価			①	②				(注 5)															
	5 価			①	②	③			(注 6)															
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ (DPT-IPV, IPV) (注 8)	不活化			①	②			③			④ (注 7)						(7.5 歳まで)							
BCG	生						①																	
麻しん、風しん (MR)	生										①							② (注 9)						
水痘	生									①		②											(注 10)	
おたふくかぜ	生									①								② (注 11)						
日本脳炎	不活化													①	②	③	(7.5 歳まで)			④	9-12 歳			
インフルエンザ	不活化																						毎年 (10 月、11 月などに) ①②	13 歳より ①
二種混合 (DT)	不活化																						11 歳 ①	12 歳
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																			(注 12)	小 6	中 1 ①②③ (注 13)	中 2- 高 1	



任意接種の推奨期間



定期接種の接種可能な期間



任意接種の接種可能な期間



添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間



健康保険での接種時期